

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES,  
ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE,  
DE TECHNIQUES AVANCÉES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,  
DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT-ETIENNE, DES MINES DE NANCY,  
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE  
ÉCOLE POLYTECHNIQUE (FILIERE TSI)

CONCOURS D'ADMISSION 1997

MATHÉMATIQUES

DEUXIÈME ÉPREUVE  
FILIERE PC  
(Durée de l'épreuve : 3 heures)

L'emploi de la calculette est interdit.

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :  
MATHÉMATIQUES II - PC.

L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière PC, comporte 4 pages.

Soit  $E$  l'espace vectoriel réel des fonctions réelles continues, définies sur l'intervalle  $I = ]0, 1[$ . Il est admis que l'application  $f \mapsto \|f\|_\infty = \sup_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$  est une norme sur  $E$ . Pour

deux fonctions  $f$  et  $g$  de  $E$ , soit  $(f | g)$  l'expression :

$$(f | g) = \int_0^1 f(t) g(t) dt .$$

Il est admis que l'application  $(f, g) \mapsto (f | g)$  est un produit scalaire sur  $E$ .

Soit  $K$  la fonction définie sur le carré  $I \times I$  par la relation :

$$K(x, t) = \begin{cases} (1-t)x, & \text{si } x \leq t, \\ t(1-x), & \text{si } x \geq t. \end{cases}$$

Il est admis que la fonction  $K$  est continue sur le carré  $C = I \times I$ .

1°) Étude de la fonction  $K$  :

- Comparer pour un point  $(x, t)$  du carré  $C$  les valeurs prises  $K(x, t)$  et  $K(t, x)$  par la fonction  $K$ . Tracer pour un réel  $t$  donné de l'intervalle  $]0, 1[$  le graphe de la fonction  $K_t : x \mapsto K(x, t)$ .
- Calculer les deux intégrales ci-dessous :

$$I_1 = \iint_C K(x, t) dx dt, \quad I_2 = \iint_C K(x, t)^2 dx dt .$$

## 2ème composition 2/4

Étant donnée une fonction  $f$  définie et continue sur l'intervalle  $I = [0, 1]$ , nulle en 0 et en 1, il est admis qu'il existe une unique fonction  $\tilde{f}$ , définie sur  $\mathbb{R}$ , impaire, périodique de période égale à 2, dont la restriction à  $I$  est la fonction  $f$ .

- c. Déterminer le développement en série de Fourier de la fonction  $\tilde{K}_t$ . En déduire que la fonction  $K_t$  est la somme d'une série trigonométrique uniformément convergente.

Étant donnée une fonction  $f$  de l'espace  $E$ , soit  $U(f)$  la fonction définie par la relation :

$$U(f)(x) = \int_0^1 K(x, t) f(t) dt .$$

Il est admis que l'application  $f \mapsto U(f)$  est une application linéaire de  $E$  dans lui-même.

2°) L'application linéaire  $U$  :

- a. Démontrer que, pour toute fonction  $f$  de l'espace vectoriel  $E$ , la fonction  $U(f)$  est deux-fois continûment dérivable. Comparer la dérivée seconde de la fonction  $U(f)$  à la fonction  $f$ . Déterminer la plus petite constante  $k$  telle que la dérivée première  $U(f)'$  de la fonction  $U(f)$  vérifie, pour toute fonction  $f$ , l'inégalité :  $\|U(f)'\|_\infty \leq k \|f\|_\infty$ .
- b. Démontrer que la fonction  $U(f)$  est égale à la somme d'une série trigonométrique uniformément convergente ; la préciser en posant :  $b_n(f) = 2 \int_0^1 f(t) \sin(n\pi t) dt$ .
- c. Démontrer que l'ensemble des réels  $\|U(f)\|_\infty$  lorsque  $f$  est une fonction de  $E$  de norme égale à 1 ( $\|f\|_\infty = 1$ ) est borné. Démontrer que l'application linéaire  $U : f \mapsto U(f)$  est une application lipschitzienne de l'espace vectoriel normé  $(E, \|\cdot\|_\infty)$  dans lui-même. Déterminer le réel  $\|U\|$  défini par la relation :

$$\|U\| = \sup_{\|f\|_\infty = 1} \|U(f)\|_\infty .$$

- d. Démontrer, pour toute fonction  $f$  de  $E$  et pour tout couple de réels  $x$  et  $y$  appartenant à l'intervalle  $I$ , la relation ci-dessous :

$$|U(f)(x) - U(f)(y)| \leq \frac{1}{2} |x - y| \|f\|_\infty .$$

- e. Déterminer le noyau et l'espace image de l'application  $U$ . En déduire que l'application  $U$ , considérée comme une application linéaire de  $E$  sur  $U(E)$ , est inversible et déterminer son inverse  $U^{-1}$ .

3°) Valeurs propres et vecteurs propres :

- a. Démontrer que l'application  $(f, g) \mapsto (U(f) | g)$  est un produit scalaire. En déduire que, si l'application linéaire  $U$  a des valeurs propres, ces valeurs propres sont strictement positives.
- b. Déterminer les valeurs propres  $\lambda_n, n=1, 2, \dots$ , de l'application linéaire  $U$ . Montrer que les valeurs propres peuvent être rangées en une suite  $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  tendant vers 0. Démontrer que l'espace propre  $E_n$  associé à la valeur propre  $\lambda_n$  est un espace vectoriel de dimension 1. Soit  $\varphi_n$  une fonction engendrant l'espace  $E_n$  telle que  $(\varphi_n | \varphi_n) = 1$ .
- c. Démontrer que, pour toute fonction  $f$  de  $E$ , la série de terme général

$$u_n(x) = \lambda_n (\varphi_n | f) \varphi_n(x), \quad n=1, 2, \dots,$$

où  $x$  est un réel de l'intervalle  $I$ , est uniformément convergente. Comparer  $U(f)(x)$  et la somme  $h(x)$  définie par la relation :

$$h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n (\varphi_n | f) \varphi_n(x).$$

4°) Puissances successives de l'application  $U$  :

- a. Pour un entier  $k$  donné strictement positif, l'application composée  $k$ -fois de  $U$  avec elle-même est notée  $U^k$ . Démontrer que, pour toute fonction  $f$  de l'espace  $E$ , la fonction  $U^k(f)$  est la somme d'une série de fonctions construites avec les fonctions  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ .
- b. Soit  $k$  un entier naturel ; soit  $p_k$  la fonction définie par la relation  $p_k(x) = x^k$  ( $p_0(x) = 1$ ). Déterminer l'image de la fonction  $p_k$  par  $U$  :  $U(p_k)$ .
- c. Calculer l'image  $U^2(p_0)$  par l'application  $U^2$  de la fonction  $p_0$ . Démontrer que, plus généralement, l'image  $U^k(p_0)$  de la fonction  $p_0$  par l'application  $U^k$  est la restriction d'une fonction polynôme à l'intervalle  $I$ . Préciser son degré et le coefficient du terme de degré le plus élevé.

5°) Un problème d'Helmholtz :

Le but de cette question est de déterminer une fonction  $g$  deux-fois continûment dérivable qui vérifie les relations **(H)** ci-dessous :

$$\text{(H)} \quad \begin{cases} \forall x \in I, -g''(x) = \lambda g(x) + h(x), \\ g(0) = 0, \quad g(1) = 0. \end{cases}$$

Le réel  $\lambda$  est une constante donnée ; la fonction réelle donnée  $h$  est continue sur l'intervalle  $I$ . Le but poursuivi est de déterminer la fonction  $g$  comme somme d'une série trigonométrique. Résoudre les équations **(H)** c'est résoudre un problème d'Helmholtz.

- a. Démontrer que, déterminer cette fonction  $g$  est équivalent à rechercher une fonction  $g$  appartenant à l'espace  $E$  vérifiant l'équation suivante

$$\text{(I)} \quad g = \lambda U(g) + k.$$

où  $k$  est une fonction qui appartient à un sous-espace vectoriel de  $E$  qui sera précisé.

- b. Dans cette question il est supposé qu'il existe une fonction  $g$  qui appartienne à  $E$  et vérifie l'équation **(I)** ; soit  $(b_n(g))_{n \in \mathbb{N}^*}$  la suite des réels définis par la relation :

$$b_n(g) = 2 \int_0^1 g(t) \sin(n\pi t) dt, \quad n=1, 2, \dots$$

Est-ce que la série de terme général  $b_n(g) \sin(n\pi x)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , est uniformément convergente dans  $I$  ?

Établir les relations vérifiées par ces réels  $b_n(g)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Démontrer qu'il existe une suite de réels  $\mu_n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , tels que, lorsque le réel  $\lambda$  est différent de tous les réels  $\mu_n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , les coefficients  $b_n(g)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , sont définis de manière unique. Les calculer.

- c. Est-ce que le procédé utilisé à la question précédente permet de construire une solution de l'équation **(I)**, lorsque le réel  $\lambda$  est différent de tous les réels  $\mu_n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  ?
- d. Discuter les équations obtenues à la question 5°.b, donnant les coefficients  $b_n(g)$ ,  $n=1, 2, \dots$ , lorsque le réel  $\lambda$  est égal à l'un des réels  $\mu_n$ . En déduire éventuellement une solution de l'équation **(I)**.