

PREMIÈRE COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES (4 heures)



L'objet de ce problème est l'étude des fonctions d'une variable réelle vérifiant une relation de la forme

$$f(x+1) - f(x-1) = \lambda f'(x).$$

Pour tout entier positif ou nul k , on désigne par $C^k(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions complexes de classe C^k d'une variable réelle.

On note Δ l'endomorphisme de $C^0(\mathbb{R})$ défini par

$$(\Delta f)(x) = f(x+1) - f(x-1);$$

pour tout nombre complexe non nul λ , on pose

$$E_\lambda = \{f \in C^1(\mathbb{R}) \mid \Delta f = \lambda f'\}$$

I

1) Soit f un élément de E_λ .

- a) Montrer que f est indéfiniment dérivable.
- b) Exprimer les dérivées successives de f en fonction de ses translatées.
- c) Montrer que si f est bornée, elle est développable en série entière sur $\mathbb{R}$.

2) Déterminer les fonctions polynômiales f appartenant à E_λ .

[on pourra développer $f(x+1)$ et $f(x-1)$ à l'aide de la formule de Taylor]

3) On désigne par T un nombre réel > 0 et par $E_\lambda(T)$ le sous-espace vectoriel de E_λ formé des fonctions périodiques de période T .

Démontrer que la dimension de $E_\lambda(T)$ est finie, et qu'elle est égale à 1 si $|\lambda|$ est supérieur ou égal à un nombre que l'on précisera, ou si λ n'est pas réel.

II

Pour toute fonction $f \in C^0(\mathbb{R})$ on note Jf la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$(Jf)(x) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x+t) dt.$$

4) a) Etant donné un entier $k \geq 0$, pour quels k' a-t-on

$$J(C^k(\mathbb{R})) \subset C^{k'}(\mathbb{R}) ?$$

b) Ecrire une relation simple entre Δf et Jf' lorsque $f \in C^1(\mathbb{R})$.

5) On fixe un nombre complexe μ .

- a) Démontrer que, si $|\mu| > 1$, la seule fonction continue bornée f vérifiant $Jf = \mu f$ est la fonction nulle.
 [On pourra poser $\|f\| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$ pour toute fonction bornée f].
- b) On suppose $|\mu| > 1$. Quels sont les éléments f de $E_{2\mu}$ tels que f' soit bornée ?
- c) Montrer que, pour tout $\mu \in]1, +\infty[$, $E_{2\mu}$ contient deux fonctions de la forme $x \mapsto e^{Kx}$, où K est un nombre réel non nul.

III

- 6) On se propose de déterminer les fonctions h bornées de $C^0(\mathbb{R})$ vérifiant $Jh = h$. Etant donnée une telle fonction h , on définit une suite de fonctions u_n par

$$u_0(x) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |h(x+t) - h(x)|^2 dt$$

$$u_n = Ju_{n-1} \quad \forall n \geq 1 .$$

- a) Vérifier que, pour $u, v \in \mathbb{R}$:

$$|h(u) - h(v)|^2 \leq \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |h(u+t) - h(v+t)|^2 dt$$

- b) En déduire que l'on a $u_1 \geq u_0$.
- c) Montrer que la suite (u_n) est croissante.
- d) Comparer u_0 à $J|h|^2 - |h|^2$.
- e) Montrer que la série de terme général $u_n(x)$ converge pour tout x .
- f) Conclure.
- 7) Soit p un entier ≥ 0 . Déterminer toutes les fonctions $f \in E_2$ telles que $f^{(p)}$ soit bornée.

IV

- 8) On définit une application g de $\mathbb{C}$ dans lui-même par

$$g(z) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sh} z}{z} & \text{si } z \neq 0 \\ 1 & \text{si } z = 0 . \end{cases}$$

- a) Calculer les parties réelles et imaginaires de $g(z)$ en fonction de celles de z .
- b) Vérifier que la fonction φ définie sur $[0, +\infty[$ par

$$\varphi(a) = \begin{cases} \frac{\operatorname{th} a}{a} & \text{si } a \neq 0 \\ 1 & \text{si } a = 0 \end{cases}$$

est strictement décroissante.

- c) On note ψ la fonction réciproque de φ , définie sur $]0, 1]$. Déterminer la limite de $\psi(x) - \frac{1}{x}$ lorsque x tend vers 0.
- d) Vérifier que la fonction $b \mapsto \operatorname{ch} \left(\psi \left(\frac{\tan b}{b} \right) \right) \frac{\sin b}{b}$ est définie sur un intervalle $[\pi, \pi + \alpha]$, $\alpha > 0$, et déterminer sa limite lorsque b tend vers π .
- e) Montrer qu'il existe un réel $\beta > 0$ tel que, pour tout $\lambda \in]-\infty, \beta]$, E_λ contienne une fonction de la forme $x \mapsto e^{Kx}$, où K est un nombre complexe non nul.