DEUXIÈME COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES (H')

(Durée: 4 heures)

Dans tout le problème la lettre K désigne un corps commutatif arbitraire. Si E et F sont des espaces vectoriels sur K , on note $\mathcal{L}(E, F)$ l'espace vectoriel des applications linéaires de E dans F ; pour tout élément T de $\mathcal{L}(E, F)$, on désigne par $\text{Ker } T$ et $\text{Im } T$ respectivement le noyau de T dans E et son sous-espace image dans F . Un élément T de $\mathcal{L}(E, E)$ est dit *nilpotent* s'il existe un entier strictement positif r tel que $T^r = 0$.

On appelle *sous-algèbre* de $\mathcal{L}(E, E)$ tout sous-espace vectoriel stable par multiplication; une sous-algèbre $\mathcal{A}$ est dite *commutative* si l'on a $ST = TS$ pour tous S et T dans $\mathcal{A}$; enfin $\mathcal{A}$ est dite *nilpotente* s'il existe un entier strictement positif r tel que le produit de r éléments quelconques de $\mathcal{A}$ soit nul, et on appelle *ordre de nilpotence* de $\mathcal{A}$ le plus petit de ces entiers r .

Le but de ce problème est d'établir quelques propriétés des sous-algèbres commutatives nilpotentes.

Première partie

Dans cette partie on note E l'espace vectoriel K^2 .

1. Soit T un endomorphisme nilpotent non nul de E , r le plus petit entier positif tel que $T^r = 0$.

a) Déterminer les dimensions de $\text{Ker } T$ et $\text{Im } T$.

b) Construire une base de E dans laquelle T est représenté par la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et préciser la valeur de r .

2. Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre commutative nilpotente non nulle de $\mathcal{L}(E, E)$. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle les matrices représentant les éléments de $\mathcal{A}$ sont exactement les matrices $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}$ avec $c \in K$.

Deuxième partie

Dans cette partie, on se donne un espace vectoriel E sur K et une décomposition de E en somme directe de sous-espaces vectoriels: $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_n$; pour tout $i = 1, \dots, n$, on note P_i le projecteur sur E_i associé à cette décomposition; on écrit aussi x_i au lieu de $P_i(x)$ pour $x \in E$.

3. Etant donné un endomorphisme T de E , construire des applications linéaires $T_{i,j}$ appartenant à $\mathcal{L}(E_j, E_i)$ telles que l'on ait $(T(x))_i = \sum_j T_{i,j}(x_j)$ pour tout $x \in E$.

On dira que T est représenté par le tableau d'applications linéaires $(T_{i,j})$.

4. Etant donné deux endomorphismes S et T de E , exprimer les composantes $(ST)_{i,j}$ de ST en fonctions de celles de S et T .

Troisième partie

Dans cette partie on pose $E = K^n$ où n est un entier strictement positif; on considère un endomorphisme nilpotent non nul T de E et on note r le plus petit entier strictement positif tel que $T^r = 0$. On pose $E_3 = \text{Im } T \cap \text{Ker } T$.

5. Vérifier que E_3 est distinct de $\{0\}$ et de E .

6. Pour quelles valeurs de r a-t-on $E_3 = \text{Im } T$?

7. Dans cette question on suppose $r \geq 3$ et on note E_1 (resp. E_2) un sous-espace vectoriel supplémentaire de $\text{Im } T$ dans E (resp. de E_3 dans $\text{Im } T$). Vérifier que, dans la décomposition en somme directe $E = E_1 \oplus E_2 \oplus E_3$, T est représenté par un tableau de la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ T_{2,1} & T_{2,2} & 0 \\ T_{3,1} & T_{3,2} & 0 \end{pmatrix}.$$

8. Montrer que $T_{2,2}$ est nilpotent et qu'il existe une base de E dans laquelle T est représenté par une matrice $(t_{i,j})$ telle que $t_{i,j}$ soit nul lorsque $i \leq j$.

9. Comparer r et n .

10. Appliquer ce qui précède au cas où $n = 4$ et où T est représenté par la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

dans la base naturelle de K^4 .

Quatrième partie

Dans cette quatrième et dernière partie, nous utiliserons les notations suivantes : si X et Y sont deux espaces vectoriels sur K et $\mathcal{Z}$ un sous-ensemble de $\mathcal{L}(X, Y)$, nous désignerons par $\mathcal{K}(\mathcal{Z})$ l'intersection des noyaux des éléments de $\mathcal{Z}$, et par $\mathcal{I}(\mathcal{Z})$ le sous-espace vectoriel de Y engendré par les images des éléments de $\mathcal{Z}$.

On considère une sous-algèbre commutative nilpotente non nulle $\mathcal{A}$ de $\mathcal{L}(E, E)$, où $E = K^n$; on note r son ordre de nilpotence et on pose $E_3 = \mathcal{I}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{K}(\mathcal{A})$.

11. Vérifier que $\mathcal{I}(\mathcal{A})$ est distinct de E et que E_3 est distinct de $\{0\}$ et de E .

12. Pour quelles valeurs de r a-t-on $E_3 = \mathcal{I}(\mathcal{A})$?

Dans la suite du problème on suppose $r \geq 3$; on note E_1 (resp. E_2) un sous-espace vectoriel supplémentaire de $\mathcal{I}(\mathcal{A})$ dans E (resp. de E_3 dans $\mathcal{I}(\mathcal{A})$). On écrit les éléments T de $\mathcal{A}$ sous la forme $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ T_{2,1} & T_{2,2} & 0 \\ T_{3,1} & T_{3,2} & 0 \end{pmatrix}$; pour $i, j = 1, 2, 3$ on note $\mathcal{A}_{i,j}$ l'espace vectoriel des $T_{i,j}$ où T parcourt $\mathcal{A}$.

13. a) Vérifier que $\mathcal{A}_{2,2}$ est une sous-algèbre commutative nilpotente de $\mathcal{L}(E_2, E_2)$ et dire pour quelles valeurs de r cette sous-algèbre est nulle.

b) Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle tous les éléments T de $\mathcal{A}$ sont représentés par des matrices $(t_{i,j})$ telles que $t_{i,j}$ soit nul lorsque $i \leq j$.

c) Comparer r et n .

A partir de maintenant on suppose $r \geq 4$.

14. Déterminer l'ordre de nilpotence r' de $\mathcal{A}_{2,2}$.

15. a) Démontrer que l'on a $T_{2,2}(\mathcal{I}(\mathcal{A}_{2,1})) \subset \mathcal{I}(\mathcal{A}_{2,1})$ pour tout $T \in \mathcal{A}$.

b) Démontrer que l'on a $\mathcal{I}(\mathcal{A}_{2,1}) = E_2$. [On pourra raisonner par l'absurde, introduire un supplémentaire E'_2 de $\mathcal{I}(\mathcal{A}_{2,1})$ dans E_2 et démontrer que $T_{2,2}$ peut s'écrire sous la forme $\begin{pmatrix} A(T) & 0 \\ C(T) & D(T) \end{pmatrix}$.]

16. Soit T un élément de $\mathcal{A}$ tel que $T_{2,1} = 0$.

a) Démontrer que $T_{2,2}$ et $T_{3,2}$ sont nuls.

b) $T_{3,1}$ est-il nul aussi?